

ALLATTAMENTO AL SENO

CONTROINDICAZIONI ALL'ALLATTAMENTO AL SENO CONDIZIONI MATERNE

Epatiti in atto

Sieropositività per HIV o AIDS conclamato

Stato di severa debilitazione di qualunque origine

Psicosi post-partum

Consumo di più di 30 sigarette al giorno

Herpes simplex bilaterale al capezzolo (finchè non guarisce)

Assunzione materna di farmaci proibiti (periodo in cui vengono assunti)

Alcoolismo e Tossicodipendenza

MALATTIE DEL BAMBINO

Galattosemia

ALLATTAMENTO AL SENO

FALSE CONTROINDICAZIONI

CONDIZIONI MATERNE

Febbre

Coliche renali, epatiche o addominali

Sieropositività per HBsAg e/o HBeAg

Herpes labiale o genitale, sifilide, TBC

Depressione post-partum

Miopia, osteoporosi, otosclerosi

Attività sportiva

Anestesia locale e generale

Seconda gravidanza, ritorno delle mestruazioni

Mastite, ingorgo, ragadi

Mastoplastica riduttiva, pregresso intervento al seno, protesi al silicone

CONDIZIONI DEL BAMBINO

Gemellarità, basso peso neonatale, prematurità

Diarrea, ittero, malattia emorragica del neonato

Incompatibilità sanguigna materno-fetale di tipo Rh

ALLATTAMENTO AL SENO

FARMACI ED ALLATTAMENTO AL SENO

IN GENERALE VALGONO LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI:

- Più del 90 % dei farmaci assunti dalla donna che allatta passa nel latte.
- Raramente la percentuale del farmaco che passa nel latte supera l' 1- 2 % della dose somministrata alla madre; questa percentuale non è il più delle volte sufficiente a dare effetti farmacologici nel lattante.
- Inoltre non è detto che il farmaco abbia caratteristiche tali da essere assorbito dall'intestino del bambino ed infine da dare effetti tossici.

CONSIGLI PRATICI:

- Consigliare sempre ad una donna che allatta di usare meno farmaci possibili.
- Somministrare il farmaco dopo la poppata per evitare l'assunzione del latte materno in coincidenza con i picchi di concentrazione plasmatica del medicinale.
- Per evitare il rischio di accumulo usare possibilmente farmaci con basso rapporto latte / plasma, evitando dosi elevate.
- Sorvegliare lo stato di salute del lattante e gli eventuali effetti collaterali.
- Evitare farmaci nuovi

ALLATTAMENTO AL SENO

FARMACI ED ALLATTAMENTO AL SENO

L'ALLATTAMENTO AL SENO E' CONTROINDICATO CON:

- Citostatici (antimetaboliti)
- Sostanze radioattive
- Antitiroidei diversi dal propiltiouracile
- Litio
- Stupefacenti
- Ergotamina
- Indometacina
- Amiodarone

ALLATTAMENTO AL SENO

L'ALLATTAMENTO AL SENO E' POSSIBILE CON:

- Alcuni farmaci psicotropi con effetti collaterali possibili ma non costanti quali insonnia, riluttanza a nutrirsi (controllare il bambino):
- Anticonvulsivanti
- Barbiturici
- Diazepan
- Farmaci che possono ridurre la produzione di latte:
- Estrogeni (inclusi i contraccettivi)
- Diuretici tiazidici
- Inibitori delle MAO

FARMACI SICURI ALLE DOSI USUALI

- Analgesici e antipiretici: paracetamolo, ac. acetilsalicilico, ibuprofen ecc.
- La maggior parte dei rimedi per tosse e raffreddore
- Antibiotici: penicillina, ampicillina, cloxacillina, eritomicina, ecc.
- Antitubercolari, antifungini, antielmintici, antimalarici (esclusi Fansidar e Meflochina)
- Antistaminici, antiacidi, digossina, insulina, broncodilatatori, corticosteroidi e la maggior parte degli antipertensivi, Integratori alimentari di ferro, iodio e vitamine.